

お薬説明書

【処方内容】

- ラベルフィーユ 28錠(レボノルゲストレル/エチニルエストラジオール)
- ファボワール 28錠(デソゲストレル/エチニルエストラジオール)

※上記どちらかのお薬を処方しています。


【服用方法】

- 生理初日～5日目以内に服用を開始し、1日1回1錠ずつ、毎日一定の時刻に服用してください。
- 28錠を飲み終わったら、翌日から新しいシートの服用をはじめてください。

▼ラベルフィーユの場合



▼ファボワールの場合



【お薬を飲み忘れた場合】

■前日分を飲み忘れた

気付いた時点ですぐに飲み忘れた分を服用し、当日分も通常通りに服用してください。

※その日は2錠服用することになります

■2日分以上連続で飲み忘れた

一度服用を中止し、次の月経が来たら新しいシートで再び服用を開始してください。

【副作用について】

低用量ピルを内服し始めて1~2カ月間は以下の副作用が起こることがあります。

- 吐き気／嘔吐
- 頭痛
- 乳房の張り
- 浮腫み
- 不正出血

日常生活に影響がない程度であれば、1～3 ヶ月は様子を見ていただくようお願いいたします。

▼このような場合はすぐに服用をやめてください

- 突然の足の痛み、腫れ
- 手足の脱力、麻痺
- 激しい頭痛、下のもつれ、喋りにくい
- 突然の息苦しさ、胸の違和感
- 突然の視力、視野障害

【飲み合わせについて】

■併用禁忌のお薬

- C型肝炎治療薬

■併用注意のお薬、サプリメント

～ピルの作用を減弱する薬剤～

- 抗てんかん薬
- 抗結核薬
- 抗 HIV 薬

- 抗真菌薬
- ペニシリン系抗生物質
- テトラサイクリン系抗生物質
- セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ)

～ピルにより作用増強する薬剤～

- プレドニゾロン
- シクロスポリン
- テオフィリン
- 三環系抗うつ薬
- ベンゾジアゼピン系
- β 遮断薬

～ピルにより作用減弱する薬剤～

- 血糖降下薬
- アセトアミノフェン、アスピリン

)

【服用を中止したい場合】

服用中のシートを全て飲み終えてから中止することを推奨しています。

※副作用などで中止したい場合は、一度医師にご相談ください

注意事項

- ・血栓症や心筋梗塞などを引き起こすリスクが高くなりますので、できる限り禁煙をしてください。しばらく様子を見ながら服用を続けていただき、1ヶ月以上出血が続くようでしたら医師にご相談くださいませ。
- ・飲み始めの最初の1週間は他の避妊法を併用してください。
- ・低用量ピルに性感染症を防止する効果はありませんので、感染防止には避妊具を使用してください。
- ・安心して服用していただけるよう、当院では1年に1回の婦人科健診・血液検査を推奨しております。